

# 0 Úprava výrazov

Táto kapitola je zameraná na prácu s výrazmi a na ich úpravy. Aj keď sa prakticky jedná o stredoškolské učivo, doporučujeme čitateľovi, aby si prepočítal všetky príklady a získal tak určité zručnosti, ktoré bude potrebovať pri štúdiu ďalších kapitol.

Vypočítajte:

1.  $\frac{1}{4} + \frac{3}{5}$

2.  $\frac{17}{4} - \frac{\frac{4}{3}}{24}$

Riešenie:

1. Zlomky sčítujeme podľa pravidla  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$ .

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{5} = \frac{1 \cdot 5 + 3 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{5 + 12}{20} = \frac{17}{20}$$

2. Zlomky odčítujeme podľa pravidla  $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{b \cdot d}$ .

Zložený zlomok upravíme na jednoduchý podľa pravidla  $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$ , nakoľko

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

$$\frac{17}{4} - \frac{\frac{4}{3}}{24} = \frac{17}{4} - \frac{4 \cdot 5}{3 \cdot 24} = \frac{17}{4} - \frac{20}{72} = \frac{17 \cdot 72 - 4 \cdot 20}{4 \cdot 72} = \frac{1224 - 80}{288} = \frac{1144}{288} = \frac{143 \cdot 8}{36 \cdot 8} = \frac{143}{36}$$

Roznásobte:

3.  $(2x+3y)^2$

5.  $(2x-3y)^2$

4.  $(2x+3y)^3$

6.  $(2x-3y)^3$

Riešenie:

Použijeme tieto pravidlá:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

3.  $(2x+3y)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$

4.  $(2x+3y)^3 = (2x)^3 + 3 \cdot (2x)^2 \cdot 3y + 3 \cdot 2x \cdot (3y)^2 + (3y)^3 = 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

Ak si nepamäťame pravidlo, môžeme umocňovať postupným násobením.

$$\begin{aligned}
 (2x+3y)^3 &= (2x+3y) \cdot (2x+3y) \cdot (2x+3y) = (2x \cdot 2x + 2x \cdot 3y + 3y \cdot 2x + 3y \cdot 3y) \cdot (2x+3y) = \\
 (4x^2 + 6xy + 6xy + 9y^2) \cdot (2x+3y) &= (4x^2 + 12xy + 9y^2) \cdot (2x+3y) = \\
 4x^2 \cdot 2x + 12xy \cdot 2x + 9y^2 \cdot 2x + 4x^2 \cdot 3y + 12xy \cdot 3y + 9y^2 \cdot 3y &= \\
 8x^3 + 24x^2y + 18xy^2 + 12x^2y + 36xy^2 + 27y^3 &= 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3 \\
 5. \quad (2x-3y)^2 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2 \\
 6. \quad (2x-3y)^3 &= (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 3y + 3 \cdot 2x \cdot (3y)^2 - (3y)^3 = 8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3
 \end{aligned}$$

Upravte na tvar súčinu:

7. $x^2 - 4$	10. $x^3 - 8$
8. $x^3 - 4x$	11. $x^5 - 8x^2$
9. $x^2 - 2$	12. $x^5 + 8x^2$

Riešenie:

Použijeme tieto pravidlá:

$$\begin{aligned}
 a^2 - b^2 &= (a+b) \cdot (a-b) \\
 a^3 - b^3 &= (a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2) \\
 a^3 + b^3 &= (a+b) \cdot (a^2 - ab + b^2) \\
 7. \quad x^2 - 4 &= x^2 - 2^2 = (x+2) \cdot (x-2) \\
 8. \quad x^3 - 4x &= x \cdot (x^2 - 4) = x \cdot (x+2) \cdot (x-2) \\
 9. \quad x^2 - 2 &= x^2 - (\sqrt{2})^2 = (x+\sqrt{2}) \cdot (x-\sqrt{2}) \\
 10. \quad x^3 - 8 &= x^3 - 2^3 = (x-2) \cdot (x^2 + x \cdot 2 + 2^2) = (x-2) \cdot (x^2 + 2x + 4) \\
 11. \quad x^5 - 8x^2 &= x^2 \cdot (x^3 - 8) = x^2 \cdot (x^3 - 2^3) = x^2 \cdot (x-2) \cdot (x^2 + 2x + 4) \\
 12. \quad x^5 + 8x^2 &= x^2 \cdot (x^3 + 8) = x^2 \cdot (x^3 + 2^3) = x^2 \cdot (x+2) \cdot (x^2 - 2x + 4)
 \end{aligned}$$

Upravte výrazy a určte, kedy majú zmysel:

13.  $\frac{2x^2 \cdot 3x^3}{4x^4}$

Riešenie:

Použijeme pravidlo  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ , pričom  $a \geq 0; m, n \in R$ .

$$\frac{2x^2 \cdot 3x^3}{4x^4} = \frac{6x^5}{4x^4} = \frac{3x^5}{2x^4} = \frac{3x \cdot x^4}{2 \cdot x^4} = \frac{3x}{2}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $4x^4 \neq 0$ , teda  $x \neq 0$ .

14.  $5x^{2n} \cdot 3x^n$

Riešenie:

$$5x^{2n} \cdot 3x^n = 15x^{2n+n} = 15x^{3n}$$

15.  $x(x-y)^2 x^2(x-y)^3$

Riešenie:

$$\begin{aligned} x(x-y)^2 x^2(x-y)^3 &= x(x^2 - 2xy + y^2) x^2(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3) = \\ (x^3 - 2x^2y + xy^2) x^2(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3) &= (x^5 - 2x^4y + x^3y^2)(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3) = \\ x^5 \cdot x^3 - 2x^4y \cdot x^3 + x^3y^2 \cdot x^3 + x^5 \cdot (-3x^2y) - 2x^4y \cdot (-3x^2y) + x^3y^2 \cdot (-3x^2y) + \\ x^5 \cdot (3xy^2) - 2x^4y \cdot (3xy^2) + x^3y^2 \cdot (3xy^2) + x^5 \cdot (-y^3) - 2x^4y \cdot (-y^3) + x^3y^2 \cdot (-y^3) &= \\ x^8 - 2x^7y + x^6y^2 - 3x^7y + 6x^6y^2 - 3x^5y^3 + 3x^6y^2 - 6x^5y^3 + 3x^4y^4 - x^5y^3 + 2x^4y^4 - x^3y^5 &= \\ x^8 - 5x^7y + 10x^6y^2 - 10x^5y^3 + 5x^4y^4 - x^3y^5 \end{aligned}$$

16.  $(x^2y^2z)(3xzy^3)$

Riešenie:

$$(x^2y^2z)(3xzy^3) = 3x^3y^5z^2$$

$$17. \frac{(2x^2y)^3 \cdot (3xz^2y)^4}{8(2xy^2z)^5}$$

Riešenie:

Použijeme tieto pravidlá:  $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$  a  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ , pričom  $a, b \geq 0; m, n \in R$

$$\frac{(2x^2y)^3 \cdot (3xz^2y)^4}{8(2xy^2z)^5} = \frac{(2^{1 \cdot 3} x^{2 \cdot 3} y^{1 \cdot 3}) \cdot (3^{1 \cdot 4} x^{1 \cdot 4} z^{2 \cdot 4} y^{1 \cdot 4})}{8(2^{1 \cdot 5} x^{1 \cdot 5} y^{2 \cdot 5} z^{1 \cdot 5})} = \frac{(8x^6y^3) \cdot (81x^4z^8y^4)}{8(32x^5y^{10}z^5)} =$$

$$\frac{81 \cdot 8 \cdot x^{6+4} y^{3+4} z^8}{8 \cdot 32 \cdot x^5 y^{10} z^5} = \frac{81x^{10}y^7z^8}{32x^5y^{10}z^5} = \frac{81x^5z^3}{32y^3}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platit  $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$ .

$$18. \frac{1}{4} \left( \frac{2^3 \cdot 5}{3 \cdot 4^2} \right) : \left( \frac{5^2 \cdot 4}{3 \cdot 2^2} \right)^2$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \left( \frac{2^3 \cdot 5}{3 \cdot 4^2} \right) : \left( \frac{5^2 \cdot 4}{3 \cdot 2^2} \right)^2 &= \frac{1}{4} \left( \frac{8 \cdot 5}{3 \cdot 16} \right) : \left( \frac{25 \cdot 4}{3 \cdot 4} \right)^2 = \frac{1}{4} \left( \frac{8 \cdot 5}{3 \cdot 16} \right) \cdot \left( \frac{3}{25} \right)^2 = \frac{1}{4} \left( \frac{8.5}{3.16} \right) \cdot \left( \frac{9}{625} \right) = \\ \frac{8 \cdot 5 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 16 \cdot 625} &= \frac{360}{120000} = \frac{3 \cdot 120}{1000 \cdot 120} = \frac{3}{1000} \end{aligned}$$

19.  $(x^{m+n}y^{m-n})(x^{m-n}y^{m+n}); m > n$

Riešenie:

$$(x^{m+n}y^{m-n})(x^{m-n}y^{m+n}) = x^{m+n+m-n}y^{m-n+m+n} = x^{2m}y^{2m} = (xy)^{2m}$$

$$20. \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$$

Riešenie:

Zlomok usmerníme tak, že jeho čitateľa aj menovateľa rozšírimo výrazom  $2-\sqrt{3}$ .

$$\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \cdot \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \frac{4-2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+\sqrt{3}^2}{4-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}-\sqrt{3}^2} = \frac{4-4\sqrt{3}+3}{4-3} = \frac{7-4\sqrt{3}}{1} = 7-4\sqrt{3}$$

$$21. \frac{\frac{2}{\sqrt{2}+1} + \sqrt{2}-1}{\frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{\sqrt{2}-1}{2}}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{2}{\sqrt{2}+1} + \sqrt{2}-1}{\frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{\sqrt{2}-1}{2}} &= \frac{\frac{2+(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}+1}}{\frac{2 \cdot 2 - (\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{2(\sqrt{2}+1)}} = \frac{\frac{2+(2-\sqrt{2}+\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}+1}}{\frac{4-(2-\sqrt{2}+\sqrt{2}-1)}{2(\sqrt{2}+1)}} = \frac{\frac{2+(1)}{\sqrt{2}+1}}{\frac{4-(1)}{2(\sqrt{2}+1)}} = \frac{\frac{3}{\sqrt{2}+1}}{\frac{3}{2(\sqrt{2}+1)}} = \\ \frac{3}{\sqrt{2}+1} : \frac{3}{2(\sqrt{2}+1)} &= \frac{3}{\sqrt{2}+1} \cdot \frac{2(\sqrt{2}+1)}{3} = 2 \end{aligned}$$

$$22. \left(1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2 &= \left(1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) \cdot \left(1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) = \\ 1 \cdot 1 + \frac{x}{y} \cdot 1 + \frac{y}{x} \cdot 1 + 1 \cdot \frac{x}{y} + \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y} + 1 \cdot \frac{y}{x} + \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cdot \frac{y}{x} &= \\ 1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + 1 + \frac{y}{x} + 1 + \frac{y^2}{x^2} &= 3 + \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = \frac{3x^2y^2 + 2x^3y + 2xy^3 + x^4 + y^4}{x^2y^2} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $x \neq 0, y \neq 0$ .

$$23. \frac{x-y}{xy+x^2} \cdot \frac{x^4-y^4}{y^2-2xy+x^2}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{x-y}{xy+x^2} \cdot \frac{x^4-y^4}{y^2-2xy+x^2} &= \frac{x-y}{x(y+x)} \cdot \frac{(x^2-y^2)(x^2+y^2)}{(y-x)^2} = \\ \frac{x-y}{x(y+x)} \cdot \frac{(x-y)(x+y)(x^2+y^2)}{(y-x)^2} &= \frac{(x-y)(x-y)(x+y)(x^2+y^2)}{x(y+x)(y-x)^2} = \\ \frac{(x-y)^2(x+y)(x^2+y^2)}{x(y+x)(x-y)^2} &= \frac{x^2+y^2}{x} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $x \neq 0, y+x \neq 0, y-x \neq 0$ , teda  $x \neq 0, y \neq \pm x$ .

$$24. \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - y^2} \cdot \left( \frac{4x^3}{x^3 - y^3} : \frac{2x^3}{x^2 - 2xy + y^2} \right)$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - y^2} \cdot \left( \frac{4x^3}{x^3 - y^3} : \frac{2x^3}{x^2 - 2xy + y^2} \right) &= \frac{x^2 + xy + y^2}{(x-y)(x+y)} \cdot \frac{4x^3}{x^3 - y^3} \cdot \frac{x^2 - 2xy + y^2}{2x^3} = \\ \frac{x^2 + xy + y^2}{(x-y)(x+y)} \cdot \frac{4x^3}{(x-y)(x^2 + xy + y^2)} \cdot \frac{(x-y)^2}{2x^3} &= \frac{2}{x+y} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť

$x - y \neq 0, x + y \neq 0, x^2 + xy + y^2 \neq 0, x^3 \neq 0$ , teda  $x \neq \pm y, x \neq 0, x^2 + xy + y^2 \neq 0$ .

$$25. \frac{\frac{x^2 - y^2}{x+y}}{\frac{x^2 + 2xy + y^2}{3y-3x}}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x^2 - y^2}{x+y}}{\frac{x^2 + 2xy + y^2}{3y-3x}} &= \frac{x^2 - y^2}{x+y} : \frac{x^2 + 2xy + y^2}{3y-3x} = \frac{x^2 - y^2}{x+y} \cdot \frac{3y-3x}{x^2 + 2xy + y^2} = \\ \frac{(x-y)(x+y)}{x+y} \cdot \frac{3(y-x)}{(x+y)^2} &= \frac{3(y-x)(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{-3(y-x)^2}{(x+y)^2} = \frac{-3(x-y)^2}{(x+y)^2} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť

$x + y \neq 0, 3y - 3x \neq 0, x^2 + 2xy + y^2 \neq 0$ , teda  $x \neq \pm y$ .

$$26. \frac{\frac{x}{y} + \frac{y}{x}}{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x}{y} + \frac{y}{x}}{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}} &= \frac{\frac{x \cdot x + y \cdot y}{y \cdot x}}{\frac{y \cdot y - x \cdot x}{x \cdot y}} = \frac{\frac{x^2 + y^2}{xy}}{\frac{y^2 - x^2}{xy}} = \\ \frac{x^2 + y^2}{xy} \cdot \frac{xy}{y^2 - x^2} &= \frac{(x^2 + y^2) \cdot xy}{xy \cdot (y^2 - x^2)} = \frac{x^2 + y^2}{y^2 - x^2} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $x \neq 0, y \neq 0, y^2 - x^2 \neq 0$ , teda  $x \neq 0, y \neq 0, (y-x)(y+x) \neq 0$ . Po úprave dostaneme  $x \neq 0, y \neq 0, y \neq \pm x$ .

$$27. \sqrt[3]{x^{12}}$$

Riešenie:

Použijeme tieto pravidlá:  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$  a  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ , pričom  $a \geq 0; m, n \in N$

$$\sqrt[3]{x^{12}} = \sqrt[2]{\sqrt[3]{x^{12}}} = \sqrt[6]{x^{12}} = x^{\frac{12}{6}} = x^2$$

$$28. \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x^2}y}{xy}}$$

Riešenie:

Použijeme tieto pravidlá:  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$        $\frac{1}{a^y} = a^{-y}$

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x^2}y}{xy}} &= \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x^2}y}{\sqrt{xy}}} = \frac{\sqrt[2]{\sqrt[3]{x^2}y}}{\sqrt{xy}} = \frac{\sqrt[6]{x^2}y^{\frac{1}{6}}}{\sqrt{xy}} = \\ &= \frac{x^{\frac{2}{6}}y^{\frac{1}{6}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}} = x^{\frac{2-1}{6}}y^{\frac{1-1}{2}} = x^{\frac{1}{6}}y^{\frac{-1}{2}} = x^{\frac{-1}{6}}y^{\frac{-1}{3}} = -\frac{1}{x^{\frac{1}{6}}y^{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[6]{x} \cdot \sqrt[3]{y}} \end{aligned}$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $x \neq 0, y \neq 0$ .

Pretože základ druhej odmocniny nesmie byť záporný, musí platiť  $\frac{\sqrt[3]{x^2}y}{xy} \geq 0$ .

Po úprave dostaneme  $x \geq 0$ , napokolko  $\frac{\sqrt[3]{x^2}y}{xy} = \sqrt[3]{\frac{x^2y}{x^3y^3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{xy^2}}$  a  $y^2$  je vždy nezáporné.

Výsledné podmienky teda sú:  $x > 0, y \neq 0$ .

$$29. \sqrt[3]{x\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x}}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x}} &= \sqrt[3]{x \cdot x^{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{x \cdot x^{\frac{1}{3}}} = x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{6}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{6}} = \\ &= x^{\frac{2}{6}} \cdot x^{\frac{1}{6}} \cdot x^{\frac{3}{6}} \cdot x^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{2+1+3+1}{6}} = x^{\frac{7}{6}} = \sqrt[6]{x^7} \end{aligned}$$

Pretože základ šiestej odmocniny nesmie byť záporný, musí platiť  $x^7 \geq 0$ , teda  $x \geq 0$ .

$$30. \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x^3} \cdot \sqrt[6]{x^5}}{x \cdot \sqrt[12]{x}}$$

Riešenie:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x^3} \cdot \sqrt[6]{x^5}}{x \cdot \sqrt[12]{x}} &= \frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{3}{4}} \cdot x^{\frac{5}{6}}}{x \cdot x^{\frac{1}{12}}} = \frac{x^{\frac{1+1+3+5}{12}}}{x^{\frac{1+1}{12}}} = \\ &= \frac{x^{\frac{6+4+9+10}{12}}}{x^{\frac{12+1}{12}}} = \frac{x^{\frac{29}{12}}}{x^{\frac{13}{12}}} = x^{\frac{29-13}{12}} = x^{\frac{16}{12}} = x^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{x^4} \end{aligned}$$

$$x \neq 0 \wedge x \geq 0 \Rightarrow x > 0$$

Pretože menovateľ zlomku sa nesmie rovnať nula, musí platiť  $x \neq 0$ . Pretože základ druhej, štvrtnej, šiestej a dvanásťtej odmocniny nesmie byť záporný, musí platiť  $x \geq 0$ .

Výsledná podmienka teda je  $x > 0$ .

Zapíšte bez použitia zlomkov:

$$31. \frac{m}{s}, \frac{kg}{m^3}, \frac{J}{kg \cdot K}, \frac{N \cdot m^2}{kg^2}, \frac{kg \cdot s^2}{m}, \frac{J}{s}$$

Riešenie:

$$\begin{array}{lll} \frac{m}{s} = m \cdot s^{-1} & \frac{J}{kg \cdot K} = J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} & \frac{kg \cdot s^2}{m} = kg \cdot s^2 \cdot m^{-1} \\ \frac{kg}{m^3} = kg \cdot m^{-3} & \frac{N \cdot m^2}{kg^2} = N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} & \frac{J}{s} = J \cdot s^{-1} \end{array}$$

Vyjadrite premennú  $x$  v závislosti od premennej  $y$ . Predpokladáme, že hodnoty premenných sú kladné reálne čísla.

$$32. y = 4x - 32$$

Riešenie:

$$y = 4x - 32$$

$$y + 32 = 4x$$

$$x = \frac{y + 32}{4}$$

$$33. y^2 = 4x - 32$$

Riešenie:

$$y^2 = 4x - 32$$

$$y^2 + 32 = 4x$$

$$x = \frac{y^2 + 32}{4}$$

$$34. y = 4x^2 - 32$$

Riešenie:

$$y = 4x^2 - 32$$

$$y + 32 = 4x^2$$

$$\frac{y}{4} + 8 = x^2$$

$$x = \sqrt{\frac{y}{4} + 8}$$

$$35. y = 4x^5 - 32$$

Riešenie:

$$y = 4x^5 - 32$$

$$y + 32 = 4x^5$$

$$\frac{y}{4} + 8 = x^5$$

$$x = \sqrt[5]{\frac{y}{4} + 8}$$

$$36. y = \frac{3}{x+5}$$

Riešenie:

$$y = \frac{3}{x+5}$$

$$y \cdot (x+5) = 3$$

$$x+5 = \frac{3}{y}$$

$$x = \frac{3}{y} - 5$$

$$37. y^3 + 2 = \frac{4}{x+2}$$

Riešenie:

$$y^3 + 2 = \frac{4}{x+2}$$

$$(y^3 + 2) \cdot (x+2) = 4$$

$$x+2 = \frac{4}{y^3 + 2}$$

$$x = \frac{4}{y^3 + 2} - 2$$

$$38. y = \sqrt{x} + 2$$

Riešenie:

$$y = \sqrt{x} + 2$$

$$y - 2 = \sqrt{x}$$

Obe strany rovnosti umocníme.

$$(y - 2)^2 = (\sqrt{x})^2$$

$$y^2 - 4y + 4 = x$$

$$39. y = x + 2\sqrt{x} + 1$$

Riešenie:

$$y = x + 2\sqrt{x} + 1$$

Na pravej strane rovnosti použijeme pravidlo  $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ .

$$y = (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} \cdot 1 + 1^2$$

$$y = (\sqrt{x} + 1)^2$$

$$\text{Obe strany rovnosti odmocníme: } \sqrt{y} = \sqrt{x} + 1$$

$$\sqrt{y} - 1 = \sqrt{x}$$

$$\text{Obe strany rovnosti umocníme: } y - 2\sqrt{y} + 1 = x$$

$$40. \sqrt{y^5 - 6} = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Riešenie:

$$\sqrt{y^5 - 6} = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Na pravej strane rovnosti použijeme pravidlo  $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$ .

$$\sqrt{y^5 - 6} = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3$$

$$\sqrt{y^5 - 6} = (x+2)^3$$

Obe strany rovnosti odmocníme.

$$\sqrt[3]{\sqrt{y^5 - 6}} = \sqrt[3]{(x+2)^3}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{y^5 - 6}} = x+2$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{y^5 - 6}} - 2 = x$$

$$\sqrt[6]{y^5 - 6} - 2 = x$$

$$41. x^2 - 4xy^3 + 4y^6 = 0$$

Riešenie:

$$x^2 - 4xy^3 + 4y^6 = 0$$

Na ľavej strane rovnosti použijeme pravidlo  $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ .

$$x^2 - 2 \cdot x \cdot (2y^3) + (2y^3)^2 = 0$$

$$(x-2y^3)^2 = 0$$

$$x-2y^3 = 0$$

$$x = 2y^3$$

$$42. y = e^{x+2} + 4$$

Riešenie:

$$y = e^{x+2} + 4$$

$$y - 4 = e^{x+2}$$

Obe strany rovnosti zlogaritmujeme.

$$\ln(y-4) = \ln e^{x+2}$$

Použijeme pravidlo  $\ln e^x = x$ .

$$\ln(y-4) = x+2$$

$$\ln(y-4) - 2 = x$$

$$43. y = 10^{3x+6} - 1$$

Riešenie:

$$y = 10^{3x+6} - 1$$

$$y + 1 = 10^{3x+6}$$

Obe strany rovnosti zlogaritmujeme.

$$\log_{10}(y+1) = \log_{10}(10^{3x+6})$$

Použijeme pravidlo  $\log_{10} 10^x = x$ .

$$\log_{10}(y+1) = 3x + 6$$

$$\log_{10}(y+1) - 6 = 3x$$

$$\frac{\log_{10}(y+1) - 6}{3} = x$$

$$\frac{\log_{10}(y+1)}{3} - 2 = x$$

44.  $y = \ln(2x+6) + 2$

Riešenie:

$$y = \ln(2x+6) + 2$$

$$y - 2 = \ln(2x+6)$$

Použijeme pravidlo „Ak  $x = y$ , potom  $e^x = e^y$ .“.

$$e^{y-2} = e^{\ln(2x+6)}$$

Použijeme pravidlo  $e^{\ln x} = x$ .

$$e^{y-2} = 2x + 6$$

$$e^{y-2} - 6 = 2x$$

$$\frac{e^{y-2}}{2} - 3 = x$$

45.  $y = \log_{10}(x+7) + 1$

Riešenie:

$$y = \log_{10}(x+7) + 1$$

$$y - 1 = \log_{10}(x+7)$$

Použijeme pravidlo „Ak  $x = y$ , potom  $10^x = 10^y$ .“.

$$10^{y-1} = 10^{\log_{10}(x+7)}$$

Použijeme pravidlo  $10^{\log_{10} x} = x$ .

$$10^{y-1} = x + 7$$

$$10^{y-1} - 7 = x$$